

28			シルト	灰	混入少なめ。GL-30.0m貝殻片多目の混入。	
29						
30	5.60	5.60	30.50			
31			砂混じりシルト	暗灰	GL-31.0m貝殻片を全体に混入。	
32	1.20	1.20	31.70			
33			シルト	暗灰	若干硬質気味で有る。GL-33.0m微細砂を若干混入。	
34	2.10	2.10	33.80			
35						
36			砂混じりシルト	暗灰	砂を全体に含む。GL-35.0m微細砂を若干混入。	
37	3.60	3.60	37.40			
38						
39						
40						
41			細砂	暗灰	含水中位。粒子均一。GL-40.0mより粒子粗め。若干の小円礫点在。GL-41.0m中砂を混入。GL-43.0mφ20mmの角礫点在。含水中位~若干多目。	
42						
43						
44						
45	6.80	6.80	45.40	砂礫	暗褐色	φ10mmの円礫全体に混入。
46						
47						
48						
49				暗褐色		
50				砂礫	緑褐色	φ15mm~φ20mmの角礫を主体とする。マトリクスは砂で有る。GL-49.0mより緑褐色に変わる。φ20mmの角礫主体。GL-50.0mφ60mm~φ70mm位の巨礫点在。GL-52.0mより褐色に変わる。砂の混入多目となる。含水若干多目。φ10mm~φ15mmの角礫主体で有る。
51						
52						
53						
54	8.76	8.76	54.20	砂質シルト	暗灰	砂を全体に含む。シルト粘性中位。
55	1.25	1.25	55.45			

